



I.sz. Belgyógyászati Klinika
Igazgató: Prof. dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
Gasztroenterológiai Osztály
Vezető: Prof. Dr. Hunyady Béla egyetemi tanár

7624 Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: 72/536-000/32615, 32616 Fax: 72/536-148

A M B U L Á N S L A P

024323127

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési név...: Esetszám.....: 18840265
Születési dátum: 1963.12.18 TAJ.....: **025-293-434**
Születési hely.: Siklós Naplósám.....: 03000452
Anyja neve.....: Baranyai Lídia Foglalkozás...: Élelmiszergyártó gép
Lakcim.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. Állampolgárság: HUN
Felvételi dátum: 2022.09.21 09:03 Térítési kat...: 1
Beküldő.....: 024313121

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
K5090	Crohn-betegség, k.m.n.	U

Beavatkozások

11041	Vizsgálat	1	750
-------	-----------	---	-----

Anamnézis

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Viszerműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypetonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben.
2019.novemberben: bal v. póoplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklói Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoagulánst nem kapott.2021.03. Colonoscopia: inflammatoricus pseudopolypok és korábbi gyógyult hegek.
Gyógyszerei: Ramas 1x1, Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis.
Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor.

Jelen panaszok:

Panaszai jellemzően nincsenek, széklete rendben van, étrend függő állagú, jellemzően formált, napi 1x.
Láza nem volt EIM nincsen. Imuran dózist tartja 200 mg-on. Munkája kapcsán sokat ült, mélyvénás thrombosisa igazolódott, emiatt Eliquist kapott. Jobb láb térdhajlatig dagadtabb thrombosisa miatt. Alsó végtagi UH történt, nehézkesen gyógyul.
Ízületi fájadmai nincsenek. Eliquis javaslata lejárt. Láza nem volt.

Epikrízis:

Panaszai, korábbi ismert szűkület, colonoscopián pseudopolypok, több, mint 10 éve fennálló betegsége miatt colonoscopia kontroll megtörtént, postinflammatoricus polypokkal enyhe betegséget igazolt, így átmeneti localis szteroid kezelést alkalmaztunk, panaszmentes, CRP normális. Emelkedett MCV miatt javasolt T. Folsav 1x1 szedése.

Javasolt időszakos széklet calprotectin tesztje, 200 mcg/g alatti eredmény esetén jelen fenntartó kezelés folytatása.

Javasolt gyógyszeres kezelés: T. Imuran 200 mg naponta, T. Salazopyrin 2x1000 mg szedés fenntartó kezelésként. Relapsus esetén Budenofalk kezelés átmeneti bevezetése javasolt, az elmúlt 1 évben ez nem vált szükségessé.

Javasolt korábbi nyombélfekély miatt fenntartó kezelésként T. rabeprazol 1x10 mg szedése.

Laborkontrollt megkértük. Javaslatokat meghosszabbítottuk.

Imuran szedése miatt a továbbiakban javasolt kontroll laborvizsgálatok: vérkép ellenőrzése 3-havonként, időszakos (6-12 havonkénti) vesefunkció (CN, creatinin), "májfunkció" (transaminase, GGT) és hasnyálmirigy enzim (lipase v. amylase) szint ellenőrzés, vagy infekciós tünetek, indokolatlanul elhúzódó vérzés, bőr- vagy nyálkahártya bevérzés esetén soron kívül javasolt gasztroenterológus (vagy belgyógyász) kontrollal. Imuran szedése mellett folsav kiegészítés javasolt, napfényt ultraibolya sugárzás fokozott, synergista daganatkeltő hatása miatt kerülni kell!

Javaslat:

JAVASOLT GYÓGYSZER: Salazopyrin
Hatóanyaga: Sulfasalazinum
Hatáserőssége: 500 mg
Beviteli módja: per os
Javasolt adagolása: 3x2 tbl
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA: Emelt (EÜ. tér.köt.):
- támogatás százalékos mértéke: 90%
- indikációs pont sorszáma: 11/a
JAVASLAT IDŐTARTAMA: 2023.09.21.

JAVASOLT GYÓGYSZER: Imuran
Hatóanyaga: Azathioprinum
Hatáserőssége: 50 mg
Beviteli módja: per os
Javasolt adagolása: 1x200 mg
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA: Emelt (EÜ. tér.köt.):
- támogatás százalékos mértéke: 90%
- indikációs pont sorszáma: 20/a
JAVASLAT IDŐTARTAMA: 2023.09.21.

A felírást indokló BNO kód: K5090
JAVASOLT GYÓGYSZER: Budenofalk
Hatóanyaga: Budesonide
Hatáserőssége: 3 mg
Beviteli módja: per os
Javasolt adagolása: 3x3 mg
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA: Emelt (EÜ. tér.köt.):
- támogatás százalékos mértéke: 90%
- indikációs pont sorszáma: 11/b
JAVASLAT IDŐTARTAMA: 2023.09.21.

Előjegyzés időpontja: 2023.01.10 10:20 B140 23127 I.Belkl. Gasztroent. II.

Pécs, 2022.09.21

.....
Czimmer József Dr.

58785

egyetemi docens

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezze!
A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.
Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem

.....
beteg aláírása